

UNIDAD MÉDICA ONCOLIFE IPS
Laboratorio Clínico

. UROANÁLISIS (PARCIAL DE ORINA) Y UROCULTIVO

i Si tiene sangrado menstrual activo o flujo vaginal abundante, espere hasta 5 días después de finalizado el periodo menstrual. Informe esta situación al personal del laboratorio.

- La muestra ideal es la primera orina de la mañana (la más concentrada y confiable).
- No use antibióticos, cremas, óvulos ni otros medicamentos en la zona genital antes de la recolección.
- Marque el recipiente con su nombre completo e identificación antes de entregarlo.

Instrucciones para hombres

1. Realice aseo suave de los genitales externos con agua y jabón neutro. Enjuague completamente.
2. Deseche la primera parte de la orina en el inodoro.
3. Recolecte la parte media de la micción directamente en el recipiente recolector de orina.
4. Deseche la última parte de la micción en el inodoro.
5. Tape el recipiente y llévelo de inmediato al laboratorio.

Instrucciones para mujeres

1. Realice aseo suave de los genitales externos con agua y jabón neutro. Enjuague completamente.
2. Separe los labios mayores con los dedos índice y medio de la mano izquierda y manténgalos separados durante toda la recolección.
3. Deseche la primera parte de la orina en el inodoro.
4. Recolecte la parte media de la micción directamente en el recipiente estéril sin soltar los labios.
5. Tape el recipiente y llévelo de inmediato al laboratorio.